

POSIFORLID® oční sprej

Kosmetický přípravek k péči o podrážděná oční víčka a pro každodenní hygienu okrajů víček

Obal umožňuje vyloučit použití konzervačních látek.

Co je oční sprej POSIFORLID® a k čemu se používá?

Oční sprej POSIFORLID® je vhodný pro péči o podrážděná oční víčka, pro každodenní hygienu okrajů víček a pro podpůrnou péči o při podráždění okrajů očních víček.

Oční sprej POSIFORLID® pomáhá jemně a se zklidňujícím účinkem odstranit případné nečistoty z očních víček a z oblasti řas; tyto nečistoty mohou vzniknout například při podráždění okrajů očních víček.

Co potřebujete vědět před použitím očního spreje POSIFORLID®?

Oční sprej POSIFORLID® se nesmí používat v případě přecitlivělosti (alergie) na některou obsaženou látku (viz seznam „Ingredients“ na balení).

Nepoužívat pro děti do 3 let.

Zvláštní opatrnost je nutná při současném použití očního spreje POSIFORLID® a očních léků. Mezi jednotlivými aplikacemi by se měl dodržet odstup nejméně 15 minut.

Pokud nosíte kontaktní čočky, nedoporučuje se používat oční sprej POSIFORLID®. I když je aplikován na oční víčko, může oční sprej POSIFORLID® za jistých okolností přijít do styku s kontaktní čočkou. Protože nejsou k dispozici dostatečná data o snášenlivosti tohoto očního spreje s materiálem kontaktních čoček, nedoporučujeme jejich současné použití.

Jak se má používat oční sprej POSIFORLID®?

Před prvním použitím stlačte přibližně 3–4krát pumpičku, až dokud nevidíte mlhu z rozstřikovače. Poté je lahvička připravena pro další použití.

Oční sprej POSIFORLID® lze používat dvěma způsoby podle toho, zda jej používáte k péči o víčka, nebo k odstranění nečistot z víček.

Jestliže chcete pečovat o zarudlá a podrážděná oční víčka, použijte oční sprej POSIFORLID® následujícím způsobem:




- Držte lahvičku ve vzdálenosti asi 10 cm od oka.
- Zavřete oči.
- Aplikujte oční sprej POSIFORLID® 1–2 stříknutími na zavřená oční víčka.
- Důležité: Nestříkejte do otevřených očí. Nedotýkejte se povrchu oka rozprašovačem.

Jestliže chcete odstranit nečistoty z očních víček nebo z oblasti řas nebo použít sprej k hygieně okrajů očních víček, máte dvě možnosti aplikace:


1) Aplikace pomocí vatových tyčinek a nastříkání na oko



- Navlhčete vatovou tyčinku očním sprejem POSIFORLID®
- Nastříkejte oční sprej POSIFORLID® na zavřené oko, jak bylo popsáno výše.
- Masírujte okraj víčka navlženou vatovou tyčinkou, nejprve horní víčko shora dolů a pak dolní víčko zdola vzhůru, a to vždy po celé šířce víčka.
- Následně opatrně přejíždějte tyčinkou od vnějšího do vnitřního koutku oka. Každá vatová tyčinka by měla být použita pouze jednou.
- Nakonec vyčistěte okraje víček vlhkým vatovým tampónem.
- Pro vyčištění okraje víčka vatovým tampónem utírejte víčko vždy zvenku směrem dovnitř.



2) Aplikace vatovým tampónem



- Stříkněte několik dávek očního spreje POSIFORLID® na vatový tampon tak, aby byl dostatečně navlžen.
- Pro vyčištění okraje víčka vatovým tampónem utírejte víčko vždy zvenku směrem dovnitř.

Při používání oční kosmetiky by se měl oční sprej POSIFORLID® aplikovat před líčením nebo po odlíčení.

Obecně se doporučuje provádět každodenní hygienu okrajů víček ráno a večer. Oční sprej POSIFORLID® lze aplikovat až 4krát denně. Při výskytu výraznějších očních obtíží se obraťte na svého očního lékaře.

Doba, po kterou lze používat oční sprej POSIFORLID®, není omezena.

Nepoužívejte oční sprej POSIFORLID®, pokud je poškozená lahvička nebo její balení.

Nepoužívejte vnitřně.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Jaké nežádoucí účinky se mohou objevit při aplikaci očního spreje POSIFORLID®?

Při používání očního spreje POSIFORLID® se mohou objevit příznaky, jako je pálení, zarudnutí nebo svědění očí či očních víček. To ukazuje na možnou nesnášenlivost nebo přecitlivělost na některou ze složek přípravku. Pokud se u Vás objeví takové příznaky, ukončete používání spreje a požádejte o radu svého praktického nebo očního lékaře.

Datum informace:

Červen 2023

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35
66129 Saarbrücken, Německo
Tel.: +49 6805/9292-0
Fax: +49 6805/9292-88
E-mail: info@ursapharm.de
www.ursapharm.de

Distribuce v České republice:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Tel.: +420 295 560 468
E-mail: info@ursapharm.cz
www.ursapharm.cz

Užitečný tip při podráždění očních víček:

Vedle použití očního spreje k čištění a péči o oční víčka lze ošetření doplnit aplikací samozahřívací oční masky POSIFORLID®.

POSIFORLID® očný sprej

Kozmetický prípravok na starostlivosť o podráždené očné viečka a na každodennú hygienu okrajov viečok

Obal umožňuje vylúčiť použitie konzervačných látok.

Čo je POSIFORLID® očný sprej a na čo sa používa?

POSIFORLID® očný sprej je vhodný na starostlivosť o podráždené očné viečka, na každodennú hygienu okrajov viečok a ako podporná starostlivosť pri podráždení okrajov viečok.

POSIFORLID® očný sprej pomáha jemne a šetrne odstrániť prípadné šupinky, ktoré sa vytvorili na očných viečkach alebo medzi riasami, k čomu často dochádza napr. pri podráždení okrajov viečok.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete POSIFORLID® očný sprej?

POSIFORLID® očný sprej sa nesmie používať, ak ste alergický (precitlivený) na niektorú jeho zložku (pozri informáciu „Ingredients“ na obale).

Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Mimoriadna opatrnosť je nutná pri použití POSIFORLID® očného spreja, ak súčasne používate lieky na oči. Medzi jednotlivými aplikáciami by sa mal dodržať časový odstup minimálne 15 minút.

Ak nosíte kontaktné šošovky, nemali by ste používať POSIFORLID® očný sprej. Aj pri aplikácii na očné viečko sa môže POSIFORLID® očný sprej za určitých okolností dostať do kontaktu so šošovkami. Keďže nie je k dispozícii dostatok informácií o znášanlivosti s materiálmi kontaktných šošoviek, neodporúča sa súčasné používanie šošoviek a očného spreja.

Ako používať POSIFORLID® očný sprej?

Pred prvým použitím stlačte pumpičku asi 3–4 krát, až kým nezaregistrujete jemnú hmlu. Flaštička je potom pripravená na ďalšie použitie.

Existujú rôzne možnosti použitia, podľa toho, či sprej chcete použiť ako súčasť starostlivosti o viečka alebo z nich odstrániť šupinky:

Za účelom starostlivosti o začervenané a podráždené očné viečka použite POSIFORLID® očný sprej nasledovne:



- Flaštičku držte vo vzdialenosti asi 10 cm od oka.
- Zavrite oči.
- Aplikujte 1-2 streknutia POSIFORLID® očného spreja na zatvorené očné viečka.
- Dôležité: Nestriekajte do otvorených očí. Nedotýkajte povrchu oka očí koncovkou rozprašovača.

Ak chcete odstrániť šupinky z očných viečok alebo medzi riasami, príp. použiť produkt na hygienu okraja viečok, máte dve možnosti použitia:

1) Aplikácia vatovou tyčinkou a streknutím na oko




- Vatovú tyčinku navlhčite očným sprejom POSIFORLID®.
- POSIFORLID® očný sprej nastriekajte na zatvorené oko, ako je uvedené vyššie.
- Okraj viečka masírujte navlhčenou vatovou tyčinkou, najprv horné viečko zhora smerom nadol a potom spodné viečko zdola smerom nahor a to vždy po celej šírke viečka.
- Následne opatrne prechádzajte tyčinkou od vonkajšieho očného kútika smerom k vnútornému. Vatové tyčinky by sa mali použiť len raz.



- Na záver očistite okraje viečok vlhkým vatovým tampónom.
- Pri čistení očného viečka prechádzajte vatovým tampónom po očnom viečku vždy zvonka smerom dovnútra.

2) Aplikácia vatovým tampónom



- Aplikujte niekoľko streknutí očného spreja POSIFORLID® na vatový tampón, aby bol dostatočne navlhčený.
- Pri čistení okraja očného viečka prechádzajte vatovým tampónom po očnom viečku vždy zvonka smerom dovnútra.

Pri používaní očnej kozmetiky by sa mal použiť POSIFORLID® očný sprej pred nanesením make-upu alebo po jeho odstránení.

Vo všeobecnosti, odporúčame vykonávať každodennú hygienu okrajov viečok ráno a večer. POSIFORLID® očný sprej sa môže použiť až 4-krát denne. V prípade výskytu výraznejších očných ťažkostí sa obráťte na očného lekára.

Dĺžka používania očného spreja POSIFORLID® nie je obmedzená.

V prípade poškodenia flaštičky alebo obalu nepoužívajte POSIFORLID® očný sprej.

Obsah flaštičky nie je určený na vnútorné použitie.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť pri použití očného spreja POSIFORLID®?

Pri použití očného spreja POSIFORLID® sa môže vyskytnúť pálenie, začervenanie alebo svrbenie očí, príp. očných viečok. To poukazuje na možnú neznášanlivosť alebo alergiu na niektorú zo zložiek. Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, ukončite používanie a poraďte sa so svojím praktickým lekárom alebo očným lekárom.

Dátum informácie:

Jún 2023

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35
66129 Saarbrücken, Nemecko
Tel.: +49 6805/9292-0
Fax: +49 6805/9292-88
E-mail: info@ursapharm.de
www.ursapharm.de

Distribúcia na Slovensku:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské námestí 1391/11
100 00 Praha 10, Česká republika
Tel.: +420 295 560 468
E-mail: info@ursapharm.sk
www.ursapharm.sk

Užitočný tip pri podráždení okrajov očných viečok:

Okrem použitia očného spreja na čistenie a starostlivosť o okraje očných viečok môžete liečbu dodatočne podporiť aj použitím samoohrievacej očnej masky POSIFORLID®.